

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'SU :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Buğday	Kokarot (<i>Bifora radians</i>)	100 ml / da Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokarotun 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Şeker pancarı	Kokarot (<i>Bifora radians</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>) İmam kavağı (<i>Senecio vernalis</i>) Papatya (<i>Matricaria spp.</i>) Diken (<i>Carduus nutans</i>) Yabani salata (<i>Lactuca scariola</i>) Peygamber çiçeği (<i>Centaurea depressa</i>)	100 ml / da Şeker pancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

Kök ve yapraklar yoluyla absorbe olan sistemik bir herbisittir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

AROZEN suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılır. Bunun için ilaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Depoya konacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

AROZEN şekerpancarı ve köygöçüren çıktıktan sonra kullanılır. En etkili sonuç köygöçürenin 2-4 yapraklı döneminden, boyu 15-20 cm'e kadar olan devrede yapılan uygulamalardan alınır.


DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

AROZEN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı yerde aynı herbisitini veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta farklı grupların (Grup O4 harici) ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı otlarda direnç gelişmesini geciktirir veya engeller.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

AROZEN, 2,4-D Amin, 2,4-D Isooctyl ester ve MCPA ihtiva eden herbisitler ile karıştırılarak da kullanılabilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti.)



SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)		
GRUBU	O4	HERBİSİT

100 g/ l Clopyralid

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve görmede bulanıklık yapar.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

GÖZ: Cilde temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

YUTMA: Doktora başvurulmalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

CİLT: Cilde temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

SOLUMA: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın.

Doktora başvurulmalıdır.

Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve görmede bulanıklık yapar.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

(SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ)

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE :
SATIŞ FİYATI (K.D.V.DAHLİL) :

İÇİNDEKİLER:

Clopyralid

UYARI KELİMESİ:_

ZARARLILIK İŞARETİ:_

UYARI KELİMESİ:_

ZARARLILIK İFADELERİ:_

ÖNLEM İFADELERİ:_

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Arılara ve balıklara zehirlidir.

*İlacın kullanma ve içme suyuna bulaşmasına mani olunuz.

*İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr