

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NO :  
RUHSAT TARİH ve NO : 26.05.2015 / 10257  
GENEL BİLGİLER:

\* SAVANT 50 SL süspansiyon konsantre formülasyonunda pamuk, mısır, fındık, elma, bağ ve domatesde zararlılarla mücadelede kullanılan, mide ve değme etkili bir insektisittir. Zararlı larvalarının her döneminde ve fındık kurdu zararlısının erginine etkilidir.

\*SAVANT SL 50 böceklerde sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder ve ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra zararlıların beslenme ve diğer faaliyetleri durur veya çok azalır. 24 ile 60 saat içinde de zararlılar ölür.

\*SAVANT SL 50 uygulamadan sonra, bitki üzerinde ilacın kurumasından sonra yağan yağışlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

**KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR**

| BİTKİ ADI          | ZARARLI ORGANİZMA ADI                                 | UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ           | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE                |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PAMUK              | Yeşilkurt<br>( <i>Helicoverpa armigera</i> )          | 45 ml/da, larva                   | 14 gün                                                |
|                    | Pamuk yaprakkurdu<br>( <i>Spodoptera littoralis</i> ) | 40 ml/da, larva                   |                                                       |
| FINDIK             | Fındık kurdu<br>( <i>Curculio nucum</i> )             | 45 ml/da, ergin                   | 14 gün                                                |
| ELMA               | Elma içkurdu<br>( <i>Cydia pomonella</i> )            | 35 ml/100 lt su<br>yumurta, larva | 14 gün                                                |
| BAG*               | Salkım güvesi<br>( <i>Lobesia botrana</i> )           | 25 ml/100 lt su larva             | 3 gün (sofralık<br>üzüm)<br>10 gün (şaraplık<br>üzüm) |
| DOMATES<br>(Tarla) | Yeşilkurt<br>( <i>Helicoverpa armigera</i> )          | 40 ml/da, larva                   | 3 gün                                                 |
| DOMATES<br>(Sera)  | Pamuk yaprakkurdu<br>( <i>Spodoptera littoralis</i> ) | 35 ml/100 lt. su, larva           |                                                       |
| MISIR              | Mısır koçankurdu<br>( <i>Sesamia spp.</i> )           | 30 ml/da, larva                   | 3 gün                                                 |
|                    | Mısır kurdu<br>( <i>Ostrinia nubilalis</i> )          | 30 ml/da, larva                   |                                                       |

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:** Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

## SAVANT SL 50

### SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

| GRUBU | 22A | Insektisit<br>(Böcek ilacı) |
|-------|-----|-----------------------------|
|-------|-----|-----------------------------|

150 g/l Indoxacarb

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼'ü kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Yutulduğunda ve solunduğunda tehlikelidir. Cilde temas halinde hassasiyet yaratabilir.

NET MİKTARI :  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ :  
FİYATI (KDV Dahil) :

### İÇİNDEKİLER:

Indoxacarb, Dolgu maddeleri

### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

### ZARARLILIK İFADELERİ:

H302:Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H411:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ:

P264:Elleçlemeden sonra vücudun ilaç değen kısımları bol su ve sabun ile iyice yıkayın.

P270:Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.

P273:Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P301+P310:YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayınız.

P363:Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayınız.

P405:Kilit altında saklayınız.

P501: İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Gülseren BİLGİLİ  
SORUMLU MÜDÜR

Cansa

Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Tuzla Kimya San. O.S.B Melek Aras Bulvarı  
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 202 001 2827  
Sermayesi: 3.100.000 TL.

31 Ekim 2017

T.C.  
Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Bağ salkım güvesine karşı** salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

**Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı** 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

**Pamukta yeşilkurta karşı** rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

**Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı** ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

**Domateste yeşilkurta karşı** tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

**Domateste, patlıcan ve hıyarda pamuk yaprakkurduna karşı** köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

**Elma içkurdu:** Elma içkurdu'na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

**Fındık kurduna karşı** meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**SAVANT SL 50** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 22A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SAVANT SL 50'** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 22A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bilinen pek çok fungusit ve insektisitlerle karışabilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

# SAVANT SL 50

## SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

| GRUBU | 22A | İnsektisit<br>(Böcek İlacı) |
|-------|-----|-----------------------------|
|-------|-----|-----------------------------|

150 g/l Indoxacarb

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Göz ile temas halinde:** 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

**Yutulması halinde:** Hastayı kusturmaya çalışmayınız. Hemen doktora başvurulmalıdır. Ayrıca Bkz. Önlem İfadeleri: P301+P310

**Cilt ile temas halinde:** Elbiselerinizi çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını acilen 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

**Solunması halinde:** Normal şartlarda zehirli olmamasına karşın uzun süreli teneffüs edilmesi halinde hasta ortamdaki uzaklaştırılarak temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

\*İlaç, bal arıları ve tozlayıcı arıların (bombus arıları) aktif olmadığı zaman uygulanmalıdır. (örneğin, sabah erken ya da akşam saatlerinde uygulayın)

\*Baklılara ve diğer sucul canlılara zehirlidir.

\*İlacın genel olarak ilaçlama alanı dışındaki bitkilere ulaşmasına engel olunuz.

**\*Arılar zehirlidir. Çiçeklenme zamanında DEPOLAMA DURUMU:** *Kullanılmamalıdır*

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde meydana gelebilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA

cansa

**CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

[www.cansakimya.com.tr](http://www.cansakimya.com.tr)

**Gülseren BİLGİLİ**  
**SORUMLU MÜDÜR**

Cansa

Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Tuzla Kimya San. O.8.B Melek Aras Bulvarı  
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 202 001 2827  
Sermayesi: 3.100.000 TL.



Ekim 2017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.