

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH ve NO. :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCİOTLAR


KULLANILDIĞI BİTKİ	KONTROL ETTİĞİ YABANCİ OTLAR	DOZU VE UYGULAMA DÖNEMİ
Şeker Pancarı Kırmızı Pancar Yemlik Pancar	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus spp.</i>) Buy (<i>Poa annua</i>) Şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Ak kazayağı-Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Labada (<i>Rumex spp.</i>)(sadece tohumdan) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Papatya (<i>Matricaria spp.</i>) Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Yabani krizantem (<i>Chrysanthemum segetum</i>) Adi papatya (<i>Anthemis spp.</i>) Sarmaşık (<i>Polygonum spp.</i>)	Ekim öncesi 50 gr/da Çıkış öncesi (Pancar ekiminden sonra) 50 gr/da (Organik maddesi yüksek olan topraklarda her iki uygulama şeklinde 100 gr/da dozda da kullanılabilir.)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

ADOL 80 WP %1'den daha az organik madde ihtiva eden kumlu topraklarda kullanılmamalıdır.

ADOL 80 WP Şeker pancarı, Kırmızı pancar ve Yemlik pancar tarlalarında tek yıllık geniş ve bazı dar yapraklı yabancıotların mücadelesinde kullanılır. Sonuçta geniş bir yabancıot popülasyonunda güvenli ve ekonomik yabancıot kontrolü sağlar. Uygulama 2 şekilde yapılabilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)



İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	C 1	HERBİSİT
-------	-----	----------

% 80 Lenacil

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA

HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE

HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA

KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE

BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU

İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:

Hafif baş dönmesi, baş ağrısı.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

GÖZ: Göze temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurunuz

YUTMA: Ağız bol suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilemez ve kusturulmaz.

CİLT: Cilde temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurunuz.

SOLUMA: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurunuz.

Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:

Baş dönmesi ve baş ağrısı.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Lenacil

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410:Sucul ortamda uzun süre kalıcı,çok toksik etki.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P102:Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

P301+P310:Yutulması halinde:Hemen ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P280:Korucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P304+P340:SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz hava çıkartın, ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P312:Kendinizi iyi hissetmezseniz: ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P273:Çevreye verilmesinden kaçının.

P501: İlçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

1. EKİM ÖNCESİ UYGULAMA: İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için **ADOL 80 WP** çok iyi hazırlanmış, keseksiz ve otsuz tarlaya tatbik edilmelidir. Uygulamadan hemen sonra tırmık veya kombi krümler gibi aletler ile ilaç toprağın 1-2 cm. derinliğine karıştırılmalıdır. İlaç 3 cm ve daha derine karıştırıldığında fitotoksiste yapar. Böylece ilaç yabancıot köklerinin bulunduğu bölgelere taşınmış olur. İlacın toprağa karıştırılması sonucu toprağın nemi korunmuş olur ve sonradan yağması arzu edilen yağışa bağımlılık azalır. Ekim ilaçlamadan hemen sonra veya en geç iki hafta içinde yapılmalıdır. Pancar tohumları mibzerle 3 cm'den daha derine ekilmelidir.

2. ÇIKIŞ ÖNCESİ UYGULAMA (Pancar ekiminden sonra): Ekimden sonra fakat pancar bitkisi toprak yüzeyine çıkmadan önce de **ADOL 80 WP** tatbik edilebilir. Bu şekildeki uygulamada ilaç toprağa karıştırılmaz. Karıştırma işlemi yerine ekimi takiben hemen sonra yağmurlama sulama veya yeterli miktarda yağışa ihtiyaç bulunmaktadır. İlaçlamada dekara 20-30 litre su kullanılmalıdır. Uygulama ekim öncesi dozunun aynıdır.

Tavsiye edilen miktarda ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır. Sonra bu karışım yarısına kadar su doldurulmuş aletin deposuna boşaltılır. Bu işlem yapılırken aletin karıştırıcı tertibatı çalıştırılmalı ve sonra üzerine gerekli miktarda su ilave edilmelidir.


DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ADOL 80 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta farklı grupların (Grup C 1 harici) ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı otlarda direnç gelişmesini geciktirir veya engeller.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

ADOL 80 WP fungisit ve insektisitlerle karışmaz. Herbisitlerle karıştırılmadan önce bir ön deneme yapılmalıdır

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)



İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	C 1	HERBİSİT
-------	-----	----------

% 80 Lenacil

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak kuru, serin ve don olmayan yerlerde muhafaza ediniz. İlaç bu şekilde muhafaza edilirse, özelliğini imal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile korur.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Üretici firma bu ilacın etiketindeki kimyasal maddeye uygunluğu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında etikette yer alan kullanma gayesine uyacağını beyan eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Üründe meydana gelecek zarar, etkisizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava koşullarından, kimyasal maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar üretici firma ve Cansa'nın kontrolü dışındadır. Bu ilacın kullanılması veya tatbikatından meydana gelebilecek indirekt veya özel zararlardan üretici firma ve Cansa hiçbir suretle sorumlu değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. Üretici firma ve Cansa bu ilacın yukarıda belirtilen amaçlar dışında başka amaçlar için kullanılmasından meydana gelebilecek sonuçlar için garanti vermez. İhtilaflardan doğacak kanuni işlemlerde İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

**UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114
(SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ)**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- ***ADOL 80 WP** ilacını organik madde miktarı %1 den düşük olan kumlu (hafif) topraklarda kullanmayınız.
- *İlacın etkili maddesi topraktan yabancıotların kökleri tarafından alınır.
- *İlaç yapraklara taşınarak fotosentezi yavaşlatır.
- *İlacın etkili maddesinin topraktan yabancıot kökleri tarafından alınması toprağın organik madde miktarına ve topraktaki nem oranına bağlıdır.
- *İlaçlamadan sonra şiddetli yağmur yağarsa, pancar tohumlarının çimlenmesi olumsuz etkilenebilir.
- ***ADOL 80 WP** uygulaması sırasında toprak sıcaklığı ile hava sıcaklığı arasında büyük farklılık varsa, ilacın pancar bitkisine zararı olabilir.
- ***ADOL 80 WP** ile ilaçlama yapıldıktan sonra yeterli miktarda yağış olmazsa yağmurlama sulama yapmak fayda sağlar.
- *Tavsiye edildiği bitkiler dışındaki, meyve ağaçlarının ve diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği sahalara veya ilacın su ile taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik edilmemelidir.
- *İlaçlama esnasında ilacın tozunun veya buharının çevredeki kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunmalıdır.
- *Tarla ilaçlanırken yastık başları tekrar ilaçlanmamalıdır.
- ***ADOL 80 WP** uygulanmış tarlaya, yeni bir ürün ekilebilmesi için uygulamadan sonra en az 4 aylık bir sürenin geçmesi gerekir. Ekim öncesi toprak en az 15 cm. derinliğinde sürülmelidir.
- ***ADOL 80 WP** ile ilaçlanmış tarlaya 4 ay içinde yeniden bir ürün ekilmesi gerekmekte ise, şeker pancarı, kırmızı pancar, yemlik pancar, çilek veya ıspanak ekilebilir.
- *İlaç tavsiyeye uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.
- *İlaçlamadan hemen sonra ilaçlama aletinin tüm parçalarını **ADOL 80 WP** kalıntılarından temizleyiniz. İlaçlama tankını, pompasını hortumunu, ilaçlama memelerini ve süzgeçlerini ayrı ayrı yıkayınız.
- *İlacı akarsu, göl, havuz gibi su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- *İlacı gübre, insektisit, fungisit, yem ve tohumlar ile bir araya koymayınız.
- *Boş ilaç ambalajlarını tekrar kullanmayınız, usulüne göre imha ediniz.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr