

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH ve NO. : 16.12.1988/2237
KULLANILDIĞI BİTKİLER, ZAMANI, ŞEKLİ VE DOZU

BİTKİ ADI	UYGULAMA ZAMANI VE ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
ÇİLEK	Çiçekler görününce 15 gün arayla	75 ml / 100 lt suya
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır)	Çeltik tohumları Atonik'li suda 12 saat bekletilir. Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce.	200 ml / 100 lt suya 60 ml / dekara
SEBZE (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Patates, Karpuz)	Tohumlar Atonik'li suda 8 saat, patates yumruları kesilmeden 12 saat bekletilir. Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır. Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir defa uygulanır.	50 ml / 100 lt suya 25 ml / 100 lt suya 50 ml / 100 lt suya
MEYVE (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Kiraz, Portakal, Limon, Narenciye)	1. İlaçlama yeşil tomurcuk döneminde, 2. İlaçlama pembe gonca döneminde, 3. İlaçlama meyveler nohut büyüklüğünü alınca yapılır.	50 ml / 100 lt suya
*BAĞ	1. ve 2. ilaçlama yeni sürgünlere, 3. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında 4. İlaçlama koruk döneminde yapılır.	50 ml / 100 lt suya
BAKLAGİLLER (Fasulye, Bezelye, Nohut, Soya, Mercimek, Yer fıstığı)	Çiçeklenme öncesi ve başlangıcında (Meyve tutumu için)	50 ml / dekara
PAMUK	1. Uygulama ilk tarakta, 2. Uygulama ilk çiçekte, 3. Uygulama kozaların %90' ı oluşunca.	50 ml / dekara
SÜS BİTKİLERİ	Çelikler 5-10 dakika bandırılır. Fidelikte 10 gün arayla uygulanır. Gelişim dönemlerinde.	25 ml / 100 lt suya 16 ml / 100 lt suya 50 ml / 100 lt suya
ŞEKER PANCARI	1. Uygulama 2-3 yaprak devresinde 2. Uygulama tekleme sonrası 3. Uygulama kök kalınlaşması başlayınca	25 ml / dekara 60 ml / dekara 60 ml / dekara

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
ÖZELLİKLERİ:Tüm bitkilerde hızlı ve eşit çimlenme, çabuk köklenme, kuvvetli ve çabuk gelişim, daha iyi ve kaliteli ürün sağlamak için tohumdan hasada kadar bitkinin yaşamı boyunca kullanılabilen bir geliştiricidir. Bitkileri çeşitli olumsuz büyüme koşullarına karşı koruyan, bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik kaynaklarını faaliyete geçiren bir stimülanıttır.
ETKİ ŞEKLİ:Kolaylıkla emilerek bitki bünyesine geçer ve hücre özsuu hareketlerini hızlandırır. Böylece bitkinin bütün hücrelerine yaşamsal güç vererek çimlenme, köklenme, gelişme ve olgunlaşmanın hızlandırılmasında olumlu etki yapar. Özellikle döllenme üzerinde önemli etkisi vardır.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:Önce tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır, sonra kısmen dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak konur ve depo kalan gerekli su miktarı ile tamamlanır.
KARIŞILIRLIK DURUMU:Çok kuvvetli asit karakterdekiler hariç diğer tarım ilaçları ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir. İlaçlama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)



Suda Çözünen Konsantre (SL)

1 g/L Sodium 5-nitroguaiacolate
2 g/L Sodium orto-nitrophenolate
3 g/L Sodium para-nitrophenolate

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı ve terleme yapabilir.
İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
GÖZ: Cilde temas halinde 15-20 dakika göz açıken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.
YUTMA: Kusturmayınız. Bol su içiriniz. Tıbbi yardım alınınız.
CİLT: Cilde temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.
SOLUMA: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:
Baş ağrısı ve terleme yapabilir.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114
(SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ)

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ :
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Sodyum Tuzları

ZARARLILIK İŞARETİ: —

UYARI KELİMESİ: _

ZARARLILIK İFADELERİ: —

ÖNLEM İFADELERİ: —

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Arılara, balıklara ve kuşlara az zehirlidir.
*Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
*İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI FİRMA:

ASAHI CHEMICAL MFG. CO. LTD
500, TAKAYASU IKARUGA-CHO IKOMA-GUN
NARA PREF, JAPAN

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
Melek Aras Bulvarı No:39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58
www.cansakimya.com.tr