

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH ve NO. : 05.07.1991/2452

KULLANILDIĞI BİTKİLER, ZAMANI, ŞEKLİ VE DOZU

BİTKİ ADI	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
SEBZELER VE SÜS BİTKİLERİ	Çelik ve fideler hazırlanan çözeltiye batırılır, 60 dakika bekletilir ve dikilir. Dikimden sonra her çelik veya fideye 150 ml çözelti.	100 lt suya 25 ml 100 lt suya 25 ml
MEYVE, *BAĞ NARENCİYE, ORMAN AĞAÇLARI	Fidan ve çelikler, dikimden önce bu çözeltide 1-2 saat bekletilir. Dikimden sonra yeterli suyla fidan köklerine verilir ve yıl içinde 3 kez tekrarlanır.	100 lt suya 50 ml Fidan başına 5-10 ml
TÜM BİTKİLER	Damlama sulamayla 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir. Sulama suyu ile birlikte 7-10 gün arayla en az 3 uygulama yapılır.	Dekara 150-200 ml Dekara 250-300 ml
DOMATES, BİBER, HIYAR, PATLICAN, KABAK VB.	Çiçekler açmadan önce tomurcuklar üzerine dekara 40-50 lt suyla püskürtülür.	Dekara 50 ml
KAVUN, KARPUZ	Meyveler yumurta büyüklüğüne gelince dekara 40-50 lt suyla püskürtülür.	Dekara 15 ml
ÇİLEK	Fideler dikilmeden önce bu çözeltide 2-3 saat bekletilir. Dikimden sonra 10 gün arayla 3 kez kökten verilir.	100 lt suya 30 ml Dekara 150-200 ml
MEYVE, BAĞ, ZEYTİN, NARENCİYE, ANTEP FISTIĞI	Çiçeklenmeden 3-4 hafta önce uygulanır ve meyveler fındık büyüklüğünü alınca tekrarlanır.	100 lt suya 50-100 ml
ŞEKER PANCARI	Teklemeden 7 gün sonra ilk uygulama yapılır. İkiser hafta ara ile 3-4 kez 40-50 lt suyla uygulanır.	Dekara 20 ml

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

RACİNE, BİTKİ GELİŞİM UYARICISI VE KÖKLENDİRİCİ' dir. Bir biyostimulant olan ATONİK ve auxin(NAA) karışımıdır. Bitkilere uygulandığında, hücre büyümesi ve farklılaşması uyarılır, kök oluşumu ve gelişimi hızlanır.Köklerin gelişimine olumlu etkisi sebebi ile bitki daha sağlıklı ve çabuk büyür. Çiçek tutumu ve meyve bağlama daha erken ve düzenli olur. Bunun sonucunda hem verim artar, hem de daha muntazam ve kaliteli ürün elde edilir. Bitkilerde meyve tutumunu, verimi ve kaliteyi artırmasının yanı sıra bir diğer etkisi de meyve dökümünü önlemesidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Çok kuvvetli asit karakterdekiler hariç diğer tarım ilaçları ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

RACİNE

Bitki Gelişim Düzenleyicisi (Stimulant)

Suda Çözünen Konsantre (SL)

1 g/L Sodium 5-nitroguaiacolate
2 g/L Sodium orto-nitrophenolate
3 g/L Sodium para-nitrophenolate
25 g/L Sodium naphthaline acetate

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı ve terleme yapabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

GÖZ: Cilde temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

YUTMA: Kusturmayınız. Bol su içiriniz. Tıbbi yardım alınız.

ÇİLT: Cilde temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

SOLUMA: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın.

Doktora başvurulmalıdır.

Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:

Baş ağrısı ve terleme yapabilir.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

(SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ)

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ :
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Sodyum Tuzları

ZARARLILIK İŞARETİ: —

UYARI KELİMESİ: —

ZARARLILIK İFADELERİ: —

ÖNLEM İFADELERİ: —

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Özellikle sebzelerde uygulamadan 3 gün sonra, yapraklar susuz kalmış, pörsümüş bir görünüm alırlar ve bu 3 gün süreyle devam eder. Daha sonra bitki normal hale geçer ve gelişmesi hızlanır.

*Çiçeklerde tavsiye edilenden yüksek dozda kullanılmamalı ve 15 günden daha sık aralarla uygulama yapılmamalıdır.

*İlacı kendi ambalajında, kapalı olarak saklayınız, soğuktan ve sıcaktan koruyunuz.

*Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru yerde depolandığında imal tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile kullanılır.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI FİRMA:

ASAHI CHEMICAL MFG. CO. LTD
500, TAKAYASU IKARUGA-CHO IKOMA-GUN
NARA PREF, JAPAN

RUHSAT SAHİBİ VE DİSTRİBÜTÖR

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr